

B型肝炎予防接種を受けましょう


平成28年10月1日より、B型肝炎予防接種が、定期の予防接種となりました。

対象者： 1歳に至るまで（1歳の誕生日の前日まで）の間にある児
※沖縄市に住民登録をしている方

▶ これまでに保険適用にて接種された方は、定期接種の対象外となります。

接種回数： **3回**

＜接種回数と間隔＞※標準的な接種期間は生後2ヵ月～8ヵ月の間



※合計3回の接種を終えるまでに約半年かかるため、1回目の接種をなるべく早めに接種することが重要です！

母子感染予防で既に接種された方は、保険適用となり定期での接種はできません。親子健康手帳（母子健康手帳）等で、必ず接種記録をご確認ください。



●B型肝炎とは？

B型肝炎は、B型肝炎ウイルス感染によって起こる肝臓の病気です。B型肝炎ウイルスへの感染は、B型肝炎ウイルスに感染した血液等に接触した場合に、感染を起こすことがあります。

B型肝炎に感染すると、一過性の感染で終わる場合と、そのまま感染している状態が続いてしまう場合（この状態をキャリアといいます）があります。また、経過の違いから、急性肝炎と慢性肝炎があり、急性肝炎はまれに劇症化する場合もあることから注意が必要です。キャリアになると慢性肝炎になることがあり、そのうち一部の人では肝硬変や肝がんなど命に関わる病気を引き起こすこともあります。

●感染経路は？

感染経路は主に、B型肝炎ウイルスに感染している母親の血液によって妊娠中や出産時に胎児あるいは新生児へ感染（母子垂直感染）と、さらに血液に接する機会が多い医療従事者などの針刺し事故（汚染事故）等の感染が多く知られています。しかし、最近では、性感染や施設等（水平感染）の感染も知られてきています。

●予防の効果

B型肝炎ワクチンによる抗体獲得率は40歳までの接種では95%と報告されています。ワクチン3回接種後の感染防御効果は20年以上続くと言われてしています。ワクチンで予防することがとても大事です。

※予防接種を受けてもお子さんの体質や体調によって抗体が低いまたは免疫ができないこともあります。

※B型肝炎ワクチンによる抗体獲得率は、若いほど高い傾向にあります。

●B型肝炎ワクチンの副反応

注射部位の痛み、赤み・しこり・はれ、かゆみ、熱感などの局所症状があります。また注射部位以外の副反応としては、発熱、頭痛、吐き気、だるさ、手の脱力感などがあらわれることがありますが、これらは通常、数日以内に自然に治まります。重い副反応として、非常にまれですが、ショック、アナフィラキシー、多発性硬化症、急性散在性脳脊髄炎、ギラン・バレー症候群、脊髄炎、視神経炎、末梢神経障害の報告があります。接種後、高熱や接種部位のひどい腫れ、アレルギー、けいれんなどの症状がみられた場合は、速やかに医師の診察を受け、こども相談・健康課までご連絡ください。

○予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種後に起きた健康被害が、予防接種によるものと国で認定された場合には、予防接種法に基づく補償（医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料）を受けることができます。

沖縄市役所 こども相談・健康課 予防係 TEL 098-939-1212（内線 2232・2233）

※この説明書の情報は令和4年3月現在のものです。