

～日本脳炎の予防接種を受けましょう！～

＜通常対象者＞

(平成19年4月2日以降の生まれの方)

対象期間：第1期 → 生後6ヵ月から90ヵ月に至るまでの間
(7歳6ヵ月となる日の前日まで)

第2期 → 9歳以上13歳未満の間
(13歳の誕生日の前日まで)

接種回数：第1期 3回/第2期 1回 合計4回

＜特例対象者＞(平成8年4月2日～

平成19年4月1日生まれの方)

対象期間：20歳未満までの間(20歳の誕生日の前日まで)

接種回数：過去に受けた日本脳炎予防接種が

合計4回に満たない場合の不足回数分


※特例対象者への接種は、平成17～21年度までの通知差し控えにより接種機会を逃した方への救済として、平成23年5月20日より開始。

※但し、H19年4月2日～H21年10月1日生の方は9歳から13歳未満の間に1期(計3回)の不足分が受けられます

＜接種回数と間隔＞ ※生年月日・これまでの接種歴により、接種方法が異なります！注意しましょう！

第1期：3回(初回接種：2回、追加接種：1回)、第2期：1回

通常対象者 平成19年4月2日以降の生まれの方



特例対象者 平成8年4月2日～平成19年4月1日生まれの方

★平成23年5月20日より以前に1回も受けていない

※通常対象者の接種スケジュールを参照
6日以上の間隔で2回。2回目から6ヵ月以上の間隔をおいて3回目。4回目は9歳以上で、3回目から6日以上の間隔をおいて接種。

★平成23年5月20日より以前に1回でも受けている

6日以上の間隔をおいて、残りの回数を接種。ただし、4回目は9歳以上で接種。



※標準的な接種期間・間隔とは、病気にかかりやすい年齢や、免疫のつけやすい間隔を考慮して定められたものです。標準的な接種期間・間隔を過ぎて、対象者であれば無料で接種が受けられます。

日本脳炎とは・・・

日本脳炎ウイルスが体内に侵入し、血液を通過して脳に達し、脳細胞を破壊する病気です。

日本脳炎ウイルスに感染したブタの血液を吸った蚊(コガタアカイエカ)が、人を刺すことによって感染します。(人から人へ感染する病気ではありません。)

●日本脳炎の症状

ウイルスを持つ蚊に刺され、感染しても、症状がなく経過する 경우가ほとんどですが(不顕性感染)、発症すると、高熱・頭痛・嘔吐・意識障害・けいれんなどの症状がみられます。

また、幼少児や高齢者では死亡の危険は大きく、パーキンソン病様症状や痙攣、麻痺、精神発達遅滞、精神障害などの精神神経学的後遺症は、生存者の45～70%に残り、小児では特に重度の障害を残すことが多いとされています。

●日本脳炎の流行状況

沖縄県では、平成23年7月に日本脳炎患者が1人発生しました。ブタの日本脳炎ウイルス感染状況は、西日本を中心に陽性率が高く、ブタも蚊も多い沖縄は特に日本脳炎ウイルスに感染するリスクが高い地域と言えます。

●日本脳炎の感染を防ぐための対策

- ①予防接種を受ける。
- ②野外に出る際は、なるべく蚊に刺されないようにする。(長袖・長ズボンを着用し、蚊よけ剤を使用するなど)

●日本脳炎予防接種の副反応は？

発熱、接種部位の局所反応(発赤・はれ・かゆみ・痛みなど)、発疹、呼吸器症状(せき、鼻水など)がみられます。これらは、通常数日以内に自然に治ります。

ごくまれにショック、アナフィラキシー、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、脳炎・脳症、けいれん、血小板減少性紫斑病などの重篤な副反応が起こる可能性もあります。

定期の予防接種後に起きた健康被害が、予防接種によるものと国で認定された場合には、予防接種法に基づく補償(医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料など)を受けることができます。

沖縄市役所 こども相談・健康課 予防係 TEL 939-1212(内線 2232・2233)

※この説明書の情報は平成28年4月現在のものです。